



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

日本標準商品分類番号
87118

小柴胡湯エキス配合かぜ薬

ヘルビック®S顆粒

第②類医薬品

ヘルビックS顆粒は、『かぜ』のときの鼻水、のどの痛み、せき、たん、発熱、頭痛などの症状にすぐれた効果をあらわす6種の成分と、昔から『かぜ』のときに用いられている小柴胡湯のエキス末を配合した、のみやすい顆粒の総合かぜ薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1. 次の人には服用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります)
 4. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
 5. 服用前後は飲酒しないでください。
 6. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(6)次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
(7)インターフェロン製剤で治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

ヘルビック®S顆粒

第②類医薬品

■成分・分量

成 分	1包(1.6g)中含量	はたらき(作用)
アセトアミノフェン	300mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みなどをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりをおさえます。
ジヒドロコデインリン酸塩	8mg	せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	20mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
グアイフェネシン	83.3mg	たんをきれやすくします。
無水カフェイン	25mg	頭痛をやわらげます。
小柴胡湯エキス末	166.7mg (小柴胡湯2.02gに相当)	かぜに伴う熱感、悪寒、頭痛などの症状に効果があります。

- 添加物として、セルロース、乳糖、メタケイ酸アルミン酸Mg、サッカリンNa、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

■効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

■用法・用量

次の1回量を、1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	年 齢	1回量
15歳以上	1包	11歳以上15歳未満	2/3包
7歳以上11歳未満	1/2包	3歳以上7歳未満	1/3包
1歳以上3歳未満	1/4包	1歳未満	服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
(3)定められた用法・用量を厳守してください。

■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■包装 9包、18包

〈製品情報問い合わせ先〉

くすり相談室 ☎0120-841-704

104-8002 東京都中央区京橋 2-4-16 (Meiji Seika ファルマ株式会社)

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

〈副作用被害救済制度の問い合わせ先〉

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発 売 元

株式会社 明治

136-8908 東京都江東区新砂1-2-10

製造販売元



大昭製薬株式会社

520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

S-HRS