

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

せき、たんに カイゲン咳止錠

バクモンドウ乾燥エキス配合

医薬品

せきは、のどや気管支の病気に伴って起こる症状で、せきが長く続くと、のどを痛めたり、声がかすれるだけでなく体力が著しく消耗し、病気に対する抵抗力も弱ってきます。カイゲン咳止錠に配合されているバクモンドウは古くから、炎症性のせきをしずめる効果の高い生薬として漢方薬で使用されています。
カイゲン咳止錠はせきをしずめ、たんを出やすくする効果があるお薬です。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 過量服用・長期連用しないでください
(倦怠感や虚脱感等があらわれることがある。)
2. 次の人は服用しないでください
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
3. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
4. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがある。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は、増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、口のかわき

<効能・効果>

せき、たん

<用法・用量>

次の1回量を1日4回食後及び就寝前に服用してください。

年 齢	15才以上	11～15才未満	5～11才未満
	3錠	2錠	1錠
1回量	○○○	○○	○

用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 錠剤の取り出し方は右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突きささる等思わぬ事故につながります。)



<成分・分量>

12錠(15才以上1日量)中

成 分	分量	はたらき
リン酸ジヒドロコデイン	30 mg	せきの中枢に作用して、せきをしずめます。
dl-塩酸メチルエフェドリン	75 mg	気管支を広げ、せきをしずめます。
ノスカピン	45 mg	せきの中枢に作用して、せきをしずめます。
グアイフェネシン	300 mg	たんを出やすくして、せきを軽くします。
マレイン酸クロルフェニラミン	12 mg	せきやたんの原因となるアレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	150 mg	各成分の働きをたすけ、ねむけを除きます。
バクモンドウ乾燥エキス (バクモンドウとして1.5g)	300 mg	炎症性のせきをしずめます。

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、カルメロースCa、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有します。

<保管及び取扱い上の注意>

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。
株式会社カイゲン お客様相談室 電話 06-6202-8911
受付時間：9:00～17:00(土曜、日曜、祝日を除く)



* 発 売 元

株式会社 カイゲン
大阪市中央区道修町2丁目5番14号



* 製造販売元

大昭製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168