

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



鎮咳去痰薬

第②類医薬品

せき、たんに

# エフストリン®せきどめ液10

バクモンドウ  
麦門冬配合

®登録商標

- ・エフストリンせきどめ液10には炎症性のせきをしずめる効果を持つ生薬、麦門冬（バクモンドウ）が配合されています。
- ・エフストリンせきどめ液10はつらいせきの症状をしずめ、たんの切れをよくします。
- ・エフストリンせきどめ液10は甘くて飲み易い1回1本飲みのシロップです。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
（眠気等があらわれることがあります。）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 過量服用・長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難  
(6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状         |
|-------|-------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい         |
| 泌尿器   | 排尿困難        |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称   | 症 状                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症   | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。                                           |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

<効能・効果>

せき、たん

<用法・用量>

次の1回量を1日3回毎食後及び必要な場合には、就寝前に服用してください。  
又、場合によっては、1日6回まで約4時間の間隔をおいて服用してください。

|     |          |         |
|-----|----------|---------|
|     | 15才以上    | 15才未満   |
| 1回量 | 1本（10mL） | 服用しないこと |

用法・用量に関する注意

定められた用法・用量を厳守してください。

<成分・分量>

1日量6本(60mL)中

| 成 分                            | 分 量    | はたらき                      |
|--------------------------------|--------|---------------------------|
| ジヒドロコデインリン酸塩                   | 30mg   | せきの中枢に作用して、せきを鎮めます。       |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩                | 75mg   | 気管支を拡張、せきをおさえます。          |
| グアイフェネシン                       | 300mg  | たんの切れをよくし、せきを軽くします。       |
| d-クロルフェニラミン<br>マレイン酸塩          | 6mg    | せきやたんの原因となるアレルギー症状をおさえます。 |
| 無水カフェイン                        | 120mg  | 各成分の働きを高め、眠気をおさえます。       |
| バクモンドウ流エキス<br>(バクモンドウ1.25gに相当) | 1.25mL | 炎症性のせきを鎮めます。              |

添加物：カラメル、精製白糖、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸、パラベン、  
プロピレングリコール、香料、エタノール、エチルパニリン、グリセリン、パニリン

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記にお願い致します。  
大昭製薬株式会社 おくすり相談室  
電話 0748-88-4181  
受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）