

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎などの
くしゃみ、鼻みず、鼻づまりに
塩酸ブソイドエフェドリン・グリチルリチン酸配合

第②類医薬品

ビスティー鼻炎カプセルL

くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどの鼻炎症状は、花粉、ハウスダストなどのアレルギーを
起こす物質やウイルス、急激な温度の変化などが原因となり、鼻の粘膜に炎症が起こるこ
とから生じます。
ビスティー鼻炎カプセルLは、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどの鼻炎のつらい症状にす
ぐれた効果を発揮する成分を配合した持続性カプセルです。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
- 次の人は服用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 次の症状のある人。
前立腺肥大による排尿困難
(3) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗
物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬
 - 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
 - 長期連用しないでください

🗨 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難、むくみ
(6) 次の診断を受けた人。
緑内障、腎臓病
(7) モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中
止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を
受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかす れ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識 の混濁等があらわれる。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて 、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青 白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなり くらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

用法・用量

次の1回量を1日2回、朝夕に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15才以上（大人）	2 カプセル	2 回
7 才以上15才未満	1 カプセル	
7 才未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (3) カプセルの取り出し方は右図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してから服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突きささる等思わぬ事故につながります）



成分・分量

本剤は、4 カプセル（1 日量）中に次の成分・分量を含んでいます。

成 分	分 量	作 用
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8 mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりの症状をおさえます。
グリチルリチン酸	45mg	鼻粘膜の炎症をしずめ、鼻炎の症状をおさえます。
塩酸プソイドエフェドリン	120mg	鼻粘膜の充血やはれをおさえ、鼻づまりをやわらげます。
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	鼻汁やなみだの過剰な分泌をおさえ、鼻みずやなみだ目をやわらげます。
無水カフェイン	100mg	鼻炎に伴う頭重をやわらげます。

添加物：トウモロコシデンプン、乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、赤色102号・カラギーナン・ソルビタン脂肪酸エステル（カプセル本体）

保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は次の所にお問い合わせください。
大昭製薬株式会社 おくすり相談室
電話 0748-88-4181
受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）