

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

せき、たんに
ビスティー[®]せき止め液

バクモンドウ
麦門冬配合

- ・ビスティーせき止め液には炎症性のせきをしずめる効果を持つ生薬、麦門冬（バクモンドウ）が配合されています。
- ・ビスティーせき止め液はつらいせきの症状をしずめ、たんの切れをよくして排出します。
- ・ビスティーせき止め液は甘くて飲み易いシロップのお薬です。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人**は服用しないでください**
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. **服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**
(眠気等があらわれることがあります。)
4. **授乳中の人**は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. **過量服用・長期連用しないでください**



相談すること

1. 次の人**は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. **服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
便秘、口のかわき、眠気

(裏面へ続く)

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

<効能・効果>

せき、たん

<用法・用量>

次の1回量を添付の計量カップではかり、1日3回毎食後及び必要な場合には、就寝前に服用してください。また、場合によっては、1日6回まで約4時間の間隔をおいて服用してください。

	15才以上	11才以上 15才未満	8才以上 11才未満	5才以上 8才未満	1才以上 5才未満	1才未満
1回量	10mL 	6 mL 	5 mL 	3 mL 	2 mL 	服用しないこと ×

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。
- (3) 定められた用法・用量を厳守してください。

<成分・分量>

1日量（60mL）中

成 分	分 量	はたらき
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中枢に作用して、せきを鎮めます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を拡張、せきをおさえます。
グアイフェネシン	300mg	たんの切れをよくし、せきを軽くします。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	せきやたんの原因となるアレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	120mg	各成分の働きを高め、眠気をおさえます。
バクモンドウ流エキス （麦門冬1.25gに相当）	1.25mL	炎症性のせきを鎮めます。

添加物：カラメル、白糖、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸、パラベン、プロピレングリコール、香料、エタノール、エチルパニリン、グリセリン、パニリン

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 計量カップは使用のつど、よく水洗いして本剤とともに清潔に保管してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または次の所にお問い合わせください。

大昭製薬株式会社 おくすり相談室

電話 0748-88-4181

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

発 売 元 京都薬品ヘルスケア株式会社
京都市中京区西ノ京月輪町38番地

製造販売元 **大昭製薬株式会社**
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168