

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

総合感冒薬

第②類医薬品

ドニー[®]K顆粒

㊞登録商標

ドニーK顆粒は熱を下げ、せきをしずめるマオウ、のどの炎症をやわらげるカンゾウ、おだやかに熱を下げるケイヒ、かぜの症状により消耗した体力を回復させるニンジンなどの和漢薬に洋薬をプラスした総合感冒薬です。

⚠使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

- 次の人は服用しないこと
 - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）。
- 服用後、乗物又は、機械類の運転操作をしないこと
(眠気があらわれることがある)
- 服用時は飲酒しないこと
- 長期連用しないこと



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 高齢者。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群、 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、やけど様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合。
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は、増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
口のかわき

<効能・効果>

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

<用法・用量>

次の1回量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

	15才以上	11～15才未満	7～11才未満	7才未満
	1包	2/3包	1/2包	服用しないこと
1回量				

用法・用量に関する注意

- ① 定められた用法、用量を厳守してください。
- ② 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

<成分・分量>

1日量（3包）中

成 分	分 量	はたらき
マオウ乾燥エキス （マオウとして3,400mg）	680mg	熱を下げるとともに、気管支を広げてせきを しずめます
カンゾウエキス粉末 （カンゾウとして741mg）	95mg	炎症をおさえることにより、のどの痛みやせ きを緩和します
ケイヒ乾燥エキス （ケイヒとして660mg）	30mg	頭痛をやわらげ、熱を下げます
人參乾燥エキスーE （ニンジンとして1,088mg）	75mg	かぜの症状による体力の消耗を回復させます
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みをやわらげます
d-クロルフェニラミンマレイン 酸塩	3.5mg	くしゃみや鼻水などの症状をやわらげます
デキストロメトルフアン臭化水 素酸塩水和物	48mg	せきの中樞に作用してせきをしずめます
グアヤコールスルホン酸カリウム	250mg	たんを切れやすくし、せきを軽減します

添加物：トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、乳糖、アセスルファムK

保管及び取り扱い上の注意

- ① 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 1包を分割し、残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- ④ 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- ⑤ 使用期限をすぎたものは服用しないでください。

かぜの養生法

- 1.無理せず、安静第一を心がけましょう。安静にすることは、体力の回復とともに、かぜの治療を早めます。
- 2.食事はビタミン・カロリーの多いもの、消化の良いもの、あたたかいもの、水分の多いものをとるように心がけましょう。
- 3.入浴は熱が下がってから1～2日後にしましょう。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は次の
所にお問い合わせください。
大昭製薬株式会社 おくすり相談室
電話 0748-88-4181
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製 造 販 売 元

 **大昭製薬株式会社**
DAISHO

〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168