

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

総合感冒薬

第②類医薬品

ドニーク[®]顆粒

®登録商標

ドニーク顆粒は熱を下げ、せきをしずめるマオウ、のどの炎症をやわらげるカンゾウ、おだやかに熱を下げるケイヒ、かぜの症状により消耗した体力を回復させるニンジンなどの和漢薬に洋薬をプラスした総合感冒薬です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1. 次の人は服用しないでください
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
- 4. 服用前後は飲酒しないでください
- 5. 長期連用しないでください



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 口のかわき、眠気	
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください	

＜効能・効果＞

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

＜用法・用量＞

次の1回量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

	15才以上	11～15才未満	7～11才未満	7才未満
	1包	2/3包	1/2包	服用しないこと
1回量				×

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 定められた用法・用量を厳守してください。

＜成分・分量＞

1日量（3包）中

成 分	分 量	はたらき
マオウ乾燥エキス (マオウとして3,400mg)	680mg	熱を下げるとともに、気管支を広げてせきをしずめます
カンゾウエキス粉末 (カンゾウとして741mg)	95mg	炎症をおさえることにより、のどの痛みやせきを緩和します
ケイヒ乾燥エキス (ケイヒとして660mg)	30mg	頭痛をやわらげ、熱を下げます
人參乾燥エキス－E (ニンジンとして1,088mg)	75mg	かぜの症状による体力の消耗を回復させます
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みをやわらげます
d－クロルフェニラミンマレイ ン酸塩	3.5mg	くしゃみや鼻水などの症状をやわらげます
デキストロメトルフアン臭化水 素酸塩水和物	48mg	せきの中枢に作用してせきをしずめます
グアヤコールスホン酸カリウム	250mg	たんを切れやすくし、せきを軽減します

添加物：トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、乳糖、アセスルファムK

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4) 1包を分割し、残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

かぜの養生法

- ① 無理せず、安静第一を心がけましょう。安静にすることは、体力の回復とともに、かぜの治療を早めます。
② 食事はビタミン・カロリーの多いもの、消化の良いもの、あたたかいもの、水分の多いものをとるように心がけましょう。
③ 入浴は熱が下がってから1～2日後にしましょう。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は次の所にお問い合わせください。
大昭製薬株式会社 おくすり相談室
電話 0748-88-4181
受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

製造販売元
 **大昭製薬株式会社**
DAISHO

〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168