

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

第②類医薬品

せき、たんに
鎮咳去痰薬 **ビスティー[®]せき止め顆粒N**

- ビスティーせき止め顆粒Nは、せきを鎮める成分（ジヒドロコデインリン酸塩、*dl*-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩）を1日最大分量配合し、せき、たんに優れた効果を發揮する鎮咳去痰剤です。
- 携帯に便利な分包タイプでヨーグルト風味の溶けやすく、のみやすい顆粒剤で、外出先での急なせき、たんにもしっかり対応できます。

 使用上の注意

 してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1. **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
 2. **服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**
(眠気等があらわれることがあります。)
 3. **授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください**
 4. **過量服用・長期連用しないでください**

 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
 高熱、排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。
 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. **服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
便秘、口のかわき、眠気
4. **5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

<効能・効果>

せき、たん

<用法・用量>

次の1回量を1日3回、食後に服用してください。

年 齢	1 回 量
成人（15才以上）	1 包
11才以上15才未満	2 / 3 包
8 才以上11才未満	1 / 2 包
5 才以上 8 才未満	1 / 3 包
3 才以上 5 才未満	1 / 4 包
3 才未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)定められた用法・用量を厳守してください。

<成分・分量>

本剤は、3包中に次の成分・分量を含んでいます。

※1包は1g入りです。

成 分	分 量	作 用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中枢に作用して、せきを抑えます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を拡張して呼吸を楽にし、せきを抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	せきの原因物質の一つであるヒスタミンの作用を抑えて、アレルギーによるせきを抑えます。

添加物：粉糖、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、サッカリンNa、無水ケイ酸、香料、l-メントール、エタノール、エチルバニリン、トコフェロール、バニリン

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は次の所にお問い合わせください。

大昭製薬株式会社 おくすり相談室

電話 0748-88-4181

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

発 売 元 京都薬品ヘルスケア株式会社
京都市中京区西ノ京月輪町38番地

製造販売元 **大昭製薬株式会社**
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

®登録商標