

第2類
医薬品

開封口

279錠

販売名

薬師八味丸錠

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなる)
次の人は服用しないでください。
(1)胃腸の弱い人。(2)下痢しやすい人。
■ 相談すること
1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売
者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を
起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可
能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持っ
て医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、
このような症状の持続又は増強が見られた場合に
は、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又
は登録販売者に相談してください。 下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は
服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登
録販売者に相談してください。

紙

箱

4 560251 021477

服用に際しては、この箱の説明
文を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるよう大切
に保管してください。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない
涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してくだ
さい。(3)他の容器に入れ替えないでくだ
さい。(誤用の原因になったり品質が変わ
ります。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用
しないでください。

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は
白湯にて服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	3錠 	1日3回 (食前又は食間)
15才未満5才以上	2錠 	
5才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

(1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の
指導監督のもとに服用させてください。

AS-2

薬師
八味丸錠

YAKUSHI
HACHIMI
CANYOU

第2類医薬品

279錠
31日分

日本薬師堂

成分・分量 1日量(9錠)中

八味地黄丸エキス(1/2量)
2200mg(ジオウ2.5g、サンシュユ・サンヤク・タク
シャ・ブクリョウ・ボタンビ各1.5g、ケイヒ・ブシ末各
0.5gより抽出)
添加物:CMC-Ca、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、
タルク、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメ
ロース、マクロゴール、カルナウバロウ

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、
尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸
症:下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、
排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う
随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

【発売元】株式会社 日本薬師堂
東京都目黒区青葉台3-2-12

【お問い合わせ先】 ☎ 0120-894-894

【製造販売元】ダンヘルスケア株式会社
大阪市西区土佐堀1-4-11

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用期限

製造番号