

かぜに

医薬品

総合感冒薬

かぜねっ錠

非ピリン系

製造販売元



中央薬品株式会社
富山県 富山市西四十物町4-9

総合感冒薬 かぜねつ錠

有効成分・分量 1日量(9錠)中

アセトアミノフェン600mg エテンザミド500mg マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg
リン酸ジヒドロコティン18mg dl-塩酸メチルエフェドリン45mg 無水カフェイン90mg
添加物として、バレイシヨテンブン、乳糖、結晶セルロース、カルメロースCa、ゼラチン、
ステアリン酸Mg、黄色5号を含有。

効能・効果 かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、
たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

用法・用量 15歳以上 1回…………… 3錠
11歳以上15歳未満 1回…………… 2錠
7歳以上11歳未満 1回…………… 1錠
1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

- 注意** 1.次の人は服用しないでください。
- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそく
を起こしたことがある人。
- 2.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
3.服用に際しては、説明文書をよく読んでください。
4.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
5.配置期限を過ぎたものは服用しないでください。



配置期限

9錠入 ￥400+税

この説明書は本剤とともに保管し、
服用に際しては必ずお読みください。

総合感冒薬 かぜねつ錠

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 (眠気があらわれることがあります)

4. 服用時は飲酒しないでください。

5. 長期連用しないでください。

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 水痘（水ぼうそう）もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある小児（7歳以上15歳未満）。
- (5) 高齢者。
- (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

※裏面も必ずお読みください。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って
医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、 胸苦しさ等とともに、顔色が青白 くなり、手足が冷たくなり、冷や 汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷 様の水ぶくれ等の激しい症状が、 全身の皮ふ、口や目の粘膜にあら われる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目 が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴 い、息切れ、呼吸困難、発熱等が あらわれる。（これらの症状は、かぜ の諸症状と区別が難しいこともあり、 空せき、発熱等の症状が悪化 した場合にも、服用を中止すると ともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状
の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医
師又は薬剤師に相談してください。

便秘、口のかわき

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して
ください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になっ
たり品質が変化します）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り
返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

※効能・効果と用法・用量は外袋をご覧ください。
※小児に服用させる場合には、保護者の指導監
督のもとに服用させてください。

