

販売名 パッションードリンク

【成分・分量】 1本(50mL)中
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)
30mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 50mg、
ニコチン酸アミド60mg、チアミン硝酸塩(ビタミンB₁) 10mg、ヨクイニンエキス150mg (ヨクイニンとして1950mgに相当する)添加物としてクエン酸、dl-リンゴ酸、果糖、ブドウ糖、パラベン、プロピレングリコール、エタノール、香料を含有する。

【効能・効果】 ①次の諸症状の緩和・肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、皮膚炎、湿疹、かぶれ、ただれ、目の充血、目のかゆみ、赤鼻「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

②次の場合のビタミンB₂の補給 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】 成人(15歳以上) 1回1本(50mL)を1日1回服用してください。(15歳未満は服用しないこと。) ●用法・用量を厳守すること。

発売元 **奥田製薬株式会社**
大阪市北区天満1丁目4番5号
お薬相談 06-6351-2100(代表)
(9:00~17:00 土日祝日を除く)

製造販売元 **中外医薬生産株式会社**
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

ガラス:ビン 金属:キャップ

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

第3類医薬品



生薬
ヨクイニン
配合

50mL
パッションードリンク

肌あれ、にきび、口内炎

ビタミン
B₂B₆
配合
ドリンク

＜使用上の注意＞

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

○皮膚:発疹・発赤、かゆみ
○消化器:胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。○下痢
3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

＜保管及び取扱い上の注意＞(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

*本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

製造番号

使用期限



4