

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

痔 疾 用 薬

痔の痛み・はれ・かゆみに スパルティスヂエース坐剤

第②類医薬品

スパルティスヂエース坐剤は、痔の治療に有効なヒドロコルチゾン酢酸エステル、リドカイン、酸化亜鉛など7種の有効成分を配合した痔疾用坐剤で痔の痛み、はれ、かゆみ、出血の不快な4つの症状の改善にすぐれた効果を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が化膿している人。

2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

- (2) 10日間位使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

【用法・用量】


次の量を肛門内に挿入してください。

年 令	1回量	1日使用回数
成人（15歳以上）	1個	3回まで
15歳未満	使用しないこと	

＜用法及び用量に関する注意＞

- (1) 小児には使用させないこと。
- (2) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用すること。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用すること。
- (3) 肛門にのみ使用すること。
- (4) 定められた用法・用量を守ること。

坐剤のとり出し方



【成分・分量】（1個：1.6g中）

成 分	含量	は た ら き
リドカイン	60mg	痔の痛みとかゆみをおさえます。
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5mg	痔のはれと出血をおさえます。
酸化亜鉛	80mg	患部を保護し、炎症をおさえます。
イソプロピルメチルフェノール	2mg	患部の殺菌消毒をおこないます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	4mg	痔の炎症とかゆみをおさえます。
アラントイン	20mg	痔の炎症をおさえ、傷口の回復を早めます。
トコフェロール酢酸エステル	60mg	血流を良くし、うっ血をおさえます。

添加物としてハードファット、ハッカ油を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 30℃以下で、高温・直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管すること。特に夏期は冷蔵庫に保管すること。
- (2) 坐剤の先を下向きにして保管すること。（軟化したときの坐剤の変形を防ぐため）
- (3) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (4) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり、品質が変わる）
- (5) 使用期限（外箱に記載）をすぎた製品は使用しないこと。開封後は品質保持のため、なるべく早く使用してください。

【痔の養生法】

- (1) 散歩や軽い体操など適度な運動を行うと、全身の血液の流れを良くしますので、痔によるうっ血改善に効果をもたらします。
- (2) 毎日の入浴は、患部を清潔にするだけでなく、全身の血液の流れも良くしますので、痔によるうっ血改善に効果をもたらします。ややぬるめのお湯にゆっくりとつかってください。
- (3) お酒、タバコやからし等の刺激物は、痔の大敵のうっ血をおこしますので、できるだけ控えるように気をつけてください。
- (4) 便秘になると痔を悪化させてしまいます。肉類を控えて、野菜や果物をたっぷり食べて便秘にならないように気をつけてください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いします。

グロー薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話(06)6351-5331(代表)

(午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)

発売元



グロー薬品工業株式会社

大阪府中央区内淡路町1丁目3番2号

製造販売元



中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘七丁目5番地の5