

ビ タ ミ ン C 配 合 か ぜ 薬
カンゾウ粗エキス

ノイセルエースG

ノイセルエースGは、非ピリン系の解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン薬などの配合により、頭痛、発熱、せき、たん、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのかぜの諸症状によく効くかぜ薬です。

また、ビタミンCが、かぜなどで発熱を起こし、体内で消耗したビタミンCを補給し、体の免疫力を高め、更にカンゾウ粗エキスがのどや鼻などの炎症を抑え、かぜの症状を回復させます。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。

(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人

(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。

(眠気があらわれることがあります)

4. 服用時は飲酒しないで下さい。

5. 長期連用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 授乳中の人

(4) 高齢者

(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人

(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(7) 次の症状のある人

高熱、排尿困難

(8) 次の診断を受けた人

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振	その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること）
ぜ ん そ く	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

便秘、口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15歳以上（大人）	2 カプセル	3 回
7 歳以上15歳未満	1 カプセル	
7 歳未満	服用しないこと	

食後なるべく30分以内に服用して下さい。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を厳守して下さい。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

(3) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）



成分・分量 1日量(6カプセル)中

アセトアミノフェン	900mg	無水カフェイン	75mg
d-マレイン酸クロルフェニラミン	3.5mg	リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	12mg
リン酸ジヒドロコデイン	21mg	アスコルビン酸カルシウム（ビタミンC）	300mg
dl-塩酸メチルエフェドリン	60mg	カンゾウ粗エキス	180mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg	（原生薬換算量 720mg）	
添加物として乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、赤色3号、黄色5号、ラウリル硫酸Na、ゼラチン、無水ケイ酸、ステアリン酸Mgを含有する。			

<成分に関連する注意>

(1) 本剤に配合されているリボフラビン（ビタミンB₂）により、尿が黄色になることがあります。

(2) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、アスコルビン酸カルシウム（ビタミンC）を含有する製剤を服用していることを医師に知らせして下さい。

保管及び取扱上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）

(4) 表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 営業部

電話 (076) 475-2121

受付時間 8:10～16:40（土、日、祝日を除く）



製造販売元

中新薬業株式会社

富山県滑川市上小泉504-2