

TRADE



MARK

ずつう・はいた



頭痛歯痛薬
ケロール®

第②類医薬品



製造販売元 中新薬業株式会社

富山県滑川市上小泉504-2

のんでよくきく頭痛薬

のんでよくきく歯痛薬

非ピリン系

解熱鎮痛薬

品目番号78-404

有効成分 1日量(2包)中(1包量:1,080mg)

アスピリン.....1,000mg
アセトアミノフェン.....600mg
無水カフェイン.....100mg
プロモバレルリル尿素.....400mg
添加物として乳糖水和物を含有する。(その他の添加物
成分は、説明文書をご覧ください)

効能効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

用法用量

年 齢	1 回量
15歳以上(大人)	1 包

1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。服用間隔は6時間以上おいて下さい。

注意

1. 次の人は服用しないで下さい。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起したことがある人
 - (3) 出産予定日12週以内の妊婦
 - (4) 15歳未満の小児
2. 服用後、薬物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
3. 服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
5. 配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

配置期限

3包入 ￥300+税



5H

この説明文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

解熱鎮痛薬

第②類医薬品



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- (3) 出産予定日12週以内の妊婦
- (4) 15歳未満の小児

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。

(眠気があらわれることがあります)

4. 服用時は飲酒しないで下さい。

5. 長期連用しないで下さい。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の診断を受けた人

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
ぜ ん そ く	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

効 能 ・ 効 果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

用 法 ・ 用 量

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上(大人)	1包	2回を限度とする
15歳未満	服用しないこと	

なるべく空腹時をさけて服用して下さい。服用間隔は6時間以上おいて下さい。

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守して下さい。

成 分 ・ 分 量 1日量(2包)中

アスピリン..... 1000mg
 アセトアミノフェン..... 600mg
 無水カフェイン..... 100mg
 プロモバレリル尿素..... 400mg
 添加物として乳糖水和物、メチルセルロース、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 営業部 電話 (076)475-2121 受付時間 8:10~16:40(土、日、祝日を除く)



製造販売元 **中新薬業株式会社** 富山県滑川市上小泉504-2