

頭痛 非ピリン系 歯痛



中袋:PE
セロハン



- 一、次の人は服用しないで下さい。
 (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起したことがある人
 二、服用後、食物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
 三、服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。
 四、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
 五、配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931
 配置期限 2包入 ¥250.+税

第②類医薬品

有効成分

一日量(二包中一包量)・一、〇〇〇mg
 アセトアミノフェン……………六〇〇mg
 エテンザミド……………二〇〇mg
 アリルイソブチルアセチルサルシレート……………二〇〇mg
 昇水クマリン……………一〇〇mg
 添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、黄色4号を含有する(その他の添加物成分は、説明文書を参照下さい)

用法用量

十五歳以上(大人)一回…一包宛
 十一歳以上十五歳未満一回…一包宛
 七歳以上十一歳未満一回…一包宛
 三歳以上七歳未満一回…一包宛
 一歳以上三歳未満一回…一包宛
 一日二回を限度として、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。
 服用間隔は六時間以上おいて下さい。

製造販売元 中新薬業株式会社

富山県滑川市上小泉504-2

チンツァン

効能

- (1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
 (2) 悪寒・発熱時の解熱

非ピリン系

解熱鎮痛薬(顆粒剤)

第②類医薬品



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。

(眠気があらわれることがあります)

4. 服用時は飲酒しないで下さい。

5. 長期連用しないで下さい。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)
- (4) 高齢者
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (7) 次の診断を受けた人

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
ぜ ん そ く	

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

- (1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- (2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15歳以上	1 包	2 回を限度とする
11歳以上15歳未満	2/3包	
7 歳以上11歳未満	1/2包	
3 歳以上 7 歳未満	1/3包	
1 歳以上 3 歳未満	1/4包	
1 歳未満	服用しないこと	

なるべく空腹時をさけて服用して下さい。服用間隔は6時間以上おいて下さい。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量 1日量(2包)中

アセトアミノフェン	600mg
エテンザミド	1000mg
アリルイソプロピルアセチル尿素	120mg
無水カフェイン	120mg
添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、黄色5号、無水ケイ酸、カルメロースCa、メチルセルロースを含有する。	

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 営業部 電話 (076)475-2121 受付時間 8:10～16:40(土、日、祝日を除く)



製造販売元 **中新薬業株式会社** 富山県滑川市上小泉504-2