

ずつう・はいた 第②類医薬品

ピタリンA



発売
仁生薬品株式会社

富山県滑川市堀江636

第②類医薬品

非ピリン系

品目番号 78-491

ピタリンA

効能・効果

- (1)頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・
関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・
打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・
外傷痛の鎮痛
(2)悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

15才以上(大人)……1回1包・11才以上15才未満…1回2/3包
7才以上11才未満…1回1/2包・3才以上7才未満…1回1/3包
1才以上3才未満…1回1/4包
1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。
服用間隔は6時間以上おいてください。

成分・分量 1日量(2包)中

アセトアミノフェン……600mg・エテンザミド……………1,000mg
アシルインプロピルアセチル尿素 100mg・無水カフェイン……………160mg
添加物としてタルク、クエン酸Ca、黄色5号を含有します。
その他の添加物成分は、添付文書をご覧ください。 1包量950mg

注 意

1. 次の人は服用しないでください。
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを
起こしたことがある人。
 2. 服用後、薬物又は機械類の運転操作をしないでください。
 3. 服用に際しては、添付文書をよくお読みください。
 4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管し
てください。
 5. 小児の手の届かない所に保管してください。
 6. 表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。
- 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 中新薬業株式会社

富山県滑川市上小泉504-2

3包入 ￥350+税

配置期限

神
経
痛

生
理
痛



09D



2009年5月に改訂しました。
(下線部及びリスク区分)

この説明文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

解熱鎮痛薬(散剤)

第②類医薬品



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないで下さい。
 - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気があらわれることがあります)
- 服用時は飲酒しないで下さい。
- 長期連用しないで下さい。

相談すること



- 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)
 - 高齢者
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の診断を受けた人
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、 顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦し さ等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15歳以上(大人)	1 包	2 回を限度とする
11歳以上15歳未満	2/3 包	
7 歳以上11歳未満	1/2 包	
3 歳以上 7 歳未満	1/3 包	
1 歳以上 3 歳未満	1/4 包	
1 歳未満	服用しないこと	

なるべく空腹時をさけて服用して下さい。服用間隔は6時間以上おいて下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量 1日量（2包）中

アセトアミノフェン……………600mg エテンザミド……………1000mg
 アリルイソプロピルアセチル尿素…100mg 無水カフェイン…………… 160mg
 添加物としてタルク、クエン酸Ca、黄色5号、リン酸水素Ca水和物を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 営業部
 電 話 (076) 475-2121
 受付時間 8：10～16：40（土、日、祝日を除く）

製造販売元



中新薬業株式会社
 富山県滑川市上小泉504-2