

食あたり・下痢

1日2回服用

# 赤玉ベリン はら薬



品目番号 78-468



製造販売元 中新薬業株式会社  
富山県滑川市上小泉504-2

# 赤玉ベリン はら薬



(1包 6錠入)

2包入 ￥300+税

05D

## 有効成分 1日量(12錠)中

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 塩化ベルベリン                                                                           | 180mg |
| ロートエキス3倍散                                                                         | 90mg  |
| センブリ末                                                                             | 105mg |
| 添加物としてバレイショデンプン、乳糖、デヒドロ酢酸Na、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、赤色3号を含有する。(その他の添加物成分は、説明文書をご覧ください) |       |

## 効能効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

## 用法用量

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 15歳以上(大人)                          | 1回 6錠 |
| 11歳以上15歳未満                         | 1回 5錠 |
| 8歳以上11歳未満                          | 1回 4錠 |
| 5歳以上8歳未満                           | 1回 3錠 |
| 1日2回を限度とし服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。 |       |

## 注意

- 1.服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。
- 2.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 3.配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

配置期限



# 止 瀉 薬 (錠剤用)



## 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。

胃腸鎮痛鎮痙薬

2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1)医師の治療を受けている人

(2)発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人

(3)妊婦又は妊娠していると思われる人

(4)高齢者

(5)本人又は家族がアレルギー体質の人

(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(7)次の症状のある人

排尿困難

(8)次の診断を受けた人

心臓病、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮ふ   | 発疹・発赤、かゆみ |

(2)5～6日間服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

口のかわき

## その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

## 効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

## 用法・用量

| 年 齢         | 1 回 量   | 1 日服用回数       |
|-------------|---------|---------------|
| 15歳以上(大人)   | 6 錠     | 2 回を限度と<br>する |
| 11歳以上15歳未満  | 5 錠     |               |
| 8 歳以上11歳未満  | 4 錠     |               |
| 5 歳以上 8 歳未満 | 3 錠     |               |
| 5 歳未満       | 服用しないこと |               |

服用間隔は4時間以上おいて下さい。

## ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## 成分・分量 1日量(12錠)中

|           |       |
|-----------|-------|
| 塩化ペルベリン   | 180mg |
| ロートエキス3倍散 | 90mg  |
| センブリ末     | 105mg |

添加物としてバレイショデンプン、乳糖、デヒドロ酢酸Na、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、赤色3号、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、マクロゴール、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、酸化チタン、カルナウバロウを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

## お問い合わせ先

中新薬業株式会社 営業部

電 話 (076) 475-2121

受付時間 8:10~16:40 (土、日、祝日を除く)

製造販売元



中新薬業株式会社

富山県滑川市上小泉504-2