

品目番号 78-468

食あたり・下痢

1日2回服用

赤玉ベリン はら薬




第2類医薬品



製造販売元 中新薬業株式会社
富山県滑川市上小泉504-2

第2類医薬品

赤玉ベリン はら薬



(1包 6錠入)

2包入 ￥300+税

08K

有効成分 1日量(12錠)中

ベルベリン塩化物水和物..... 180mg
ロートエキス3倍散..... 90mg
センブリ末..... 105mg
添加物としてバレイショデンプン、乳糖水和物、デヒドロ酢酸Na、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、赤色3号を含有する。(その他の添加物成分は、説明文書をご覧ください)

効 能 効 果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

用 法 用 量

15歳以上(大人)..... 1回 6錠
11歳以上15歳未満..... 1回 5錠
8歳以上11歳未満..... 1回 4錠
5歳以上8歳未満..... 1回 3錠
1日2回を限度とし服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。

注 意

- 1.服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。
- 2.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 3.配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

配置期限



止 瀉 薬 (錠剤用)

第2類医薬品



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。

胃腸鎮痛鎮痙薬

2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人
- (3)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (4)高齢者
- (5)本人又は家族がアレルギー体質の人
- (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (7)次の症状のある人

排尿困難

(8)次の診断を受けた人

心臓病、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

(2)5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

口のかわき

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

用法・用量

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15歳以上(大人)	6 錠	2 回を限度と する
11歳以上15歳未満	5 錠	
8 歳以上11歳未満	4 錠	
5 歳以上 8 歳未満	3 錠	
5 歳未満	服用しないこと	

服用間隔は4時間以上おいて下さい。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量 1日量(12錠)中

ベルベリン塩化物水和物180mg

ロートエクス3倍散 90mg

センブリ末105mg

添加物としてバレイショデンプン、乳糖水和物、デヒドロ酢酸Na、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、赤色3号、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、マクロゴール、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、酸化チタン、カルナウバロウを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 営業部

電 話 (076) 475-2121

受付時間 8:10~16:40 (土、日、祝日を除く)

製造販売元



中新薬業株式会社

富山県滑川市上小泉504-2