

下線部：2005年9月に改訂しました。

医薬品 ビタミンE主薬製剤

この説明文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

γ-オリザノール配合
アルファ型天然ビタミンE製剤

リキナEゴールド

リキナEゴールドは、ビタミンE(トコフェロール)のソフトカプセル製剤で天然に存在する(アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ)のうち最もすぐれた生理活性を示すd-アルファ型のビタミンEを用いています。

リキナEゴールドには、アルファ型天然ビタミンEに、γ-オリザノールが配合されているので、過酸化脂質の増加を防止し、末梢血管障害や更年期に起こりがちな首すじのこりや手足のしびれ、のぼせなどに効果的であるほか老年期のビタミンEの補給に有効です。

作用と特長

1. 末梢血液循環を改善します。
毛細血管の血流をよくする作用で、末梢血行障害による諸症状(冷え、手足のしびれ、しもやけなど)を緩和します。
2. 更年期の不快感な諸症状に効果を示します。
体内のホルモン分泌をよくするので、更年期の不定愁訴の諸症状(肩のこり、のぼせなど)を緩和します。
3. 生理不順を緩和します。
4. 老年期のビタミンEの補給をします。
老年期の方々の血管壁の運動性としなやかさを保ちます。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
医師の治療を受けている人
 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 胃部不快感 |
- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合
3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。
出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい。
 4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
便秘、下痢

効 能 ・ 効 果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
 - 更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
 - 月経不順
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい。」
- 次の場合のビタミンEの補給：老年期

用 法 ・ 用 量

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
15歳以上	1 カプセル	2 ～ 3 回
15歳未満	服用しないで下さい	

1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用して下さい。

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を守って下さい。

成分・分量 1日量(3カプセル)中

d- α -トコフェロール300mg

γ -オリザノール10mg

添加物としてゼラチン、グリセリン、コムギ胚芽油を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
本品はソフトカプセル剤なので、継続的に温度50℃以上の高温になるとカプセルが柔らかくなることがあるので保管に注意して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 営業部

電 話 (076)475-2121

受付時間 8:10～16:40(土、日、祝日を除く)



製造販売元 **中新薬業株式会社**

富山県滑川市上小泉504-2