

この説明文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

制酸薬

胃痛・胃もたれ・胸やけに

ニューリキスカット(顆粒)

ニューリキスカットは制酸力が強く、即効性の制酸薬(水酸化アルミナマグネシウム)及び持続性の制酸薬(沈降炭酸カルシウム)を主成分とし、胃腸の興奮した神経をしずめ、痛みを和らげるロートエキス、胆汁の分泌を促進し、胃もたれの原因の一つである脂肪の消化を助けるウルソデオキシコール酸、胃の炎症を抑えるグリチルリチン酸二カリウム及びケイヒなどの健胃生薬を配合した飲みやすい顆粒タイプの胃腸薬です。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)
4. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)高齢者
 - (4)本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6)次の症状のある人
むくみ、排尿困難
 - (7)次の診断を受けた人
腎臓病、高血圧、心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲み過ぎ（過飲）、胃痛

用法・用量

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上（大人）	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上8歳未満	1/3包	
5歳未満	服用しないこと	

食後水又は温湯で服用して下さい。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量 3包中

水酸化アルミナマグネシウム	1800mg	沈降炭酸カルシウム	600mg
ロートエキス3倍散	90mg	ウルソデオキシコール酸	12mg
グリチルリチン酸二カリウム	45mg	ケイヒ末	300mg
ウイキョウ末	30mg	チョウジ末	30mg
ショウキョウ末	30mg	オウバクエキス	16mg
(原生薬換算量 80mg)			

添加物としてパレイショデンプン、*l*-メントール、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCaを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
(5) 表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 営業部

電話 (076) 475-2121

受付時間 8:10～16:40（土、日、祝日を除く）

製造販売元



中新薬業株式会社

富山県滑川市上小泉504-2