

※2007年5月改訂

漢方製剤

第2類医薬品

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ツムラの漢方製剤

ツムラ漢方葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒

『ツムラ漢方葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒』は、漢方処方である「葛根湯加川芎辛夷」から抽出したエキスより製した服用しやすい顆粒です。

こんな症状に効果があります

- ・ かぜ、鼻炎等による鼻づまり。
- ・ 慢性鼻炎、蓄膿症。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、 まぶたが重くなる、手がこわばる、 血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください

●効能・効果

鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎

●用法・用量

次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15 歳以上)	1 包(1.875g)	2 回
7 歳以上 15 歳未満	2 / 3 包	
4 歳以上 7 歳未満	1 / 2 包	
2 歳以上 4 歳未満	1 / 3 包	
2 歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

●成分・分量

本品2包(3.75g)中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス2.0gを含有します。

日局カッコン……………2.0g	日局シャクヤク……………1.0g
日局タイソウ……………1.5g	日局シンイ……………1.0g
日局マオウ……………1.5g	日局センキュウ……………1.0g
日局カンゾウ……………1.0g	日局ショウキョウ……………0.5g
日局ケイヒ……………1.0g	

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物を含有します。

●保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
4. 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品ですので、製品により多少顆粒の色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。
5. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

お問い合わせ先

本製品内容について、何かお気付きの点がございましたら、
お買求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元 ※



お客様相談窓口

☎ 0120-329-930

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

<http://www.tsumura.co.jp/>