

※※ 2003年7月改訂
※ 2002年3月改訂
漢方製剤

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ツムラの漢方製剤

ツムラ漢方芍薬甘草湯エキス顆粒

「芍薬甘草湯」は、漢方の原典である『傷寒論』に記載されている漢方薬で、下肢のけいれん性疼痛（こむらがえり）や、胃腸の激しい痛み等、「急激におこる筋肉のけいれんを伴う疼痛」に用いられています。
『ツムラ漢方芍薬甘草湯エキス顆粒』は、「芍薬甘草湯」から抽出したエキスより製した服用しやすい顆粒です。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

※ 1. 次の人は服用しないでください

次の診断を受けた人。
心臓病

※ 2. 症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないでください



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 次の症状のある人。
むくみ

- (5) 次の診断を受けた人。
高血圧、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
※ うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
※※ 肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

●効能・効果

急激におこる筋肉のけいれんを伴う疼痛

●用法・用量

次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15 歳以上)	1 包(1.875g)	2 回
7 歳以上 15 歳未満	2 / 3 包	
4 歳以上 7 歳未満	1 / 2 包	
2 歳以上 4 歳未満	1 / 3 包	
2 歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

●成分・分量

本品 2 包(3.75 g)中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス 1.25 g を含有します。

日局カンゾウ…………… 3.0 g 日局シャクヤク…………… 3.0 g

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖を含有します。

●保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用してください。
4. 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品ですので、製品により多少顆粒の色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。
5. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

お問い合わせ先

本製品内容について、何かお気付きの点がございましたら、
お買求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元



お客様相談窓口
電 話 (03) 3221-9700
受付時間 9:00~17:45(土、日、祝日を除く)
<http://www.tsumura.co.jp/>