

※2007年5月改訂

漢方製剤

第2類医薬品

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ツムラの漢方製剤

ツムラ漢方小建中湯エキス顆粒

「小建中湯」は、漢方の原典である『傷寒論』、『金匱要略』に記載されている漢方薬で、体質虚弱で疲労しやすく、血色がすぐれない、腹痛がある、手足がほてる、頻尿や多尿があるなどの症状を伴う「小児虚弱体質」、「疲労倦怠」、「慢性胃腸炎」等に用いられており、特に小さなお子さんに多く用いられています。『ツムラ漢方小建中湯エキス顆粒』は、「小建中湯」から抽出したエキスより製した服用しやすい顆粒です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 悪心・嘔吐のある人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

● 効能・効果

体質虚弱で疲労しやすく、血色がすぐれず、腹痛、動悸、手足のほてり、冷え、頻尿および多尿などのいずれかを伴う次の諸症：

小児虚弱体質、疲労倦怠、神経質、慢性胃腸炎、小児夜尿症、夜なき

●用法・用量

次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
7 歳以上 15 歳未満	1 包 (1.875g)	2 回
4 歳以上 7 歳未満	2 / 3 包	
2 歳以上 4 歳未満	1 / 2 包	
2 歳未満	1 / 3 包	

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
2. 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

●成分・分量

本品 2 包 (3.75g) 中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス 0.9375g と粉末飴 2.5g を含有します。

日局シャクヤク…………… 1.5g 日局カンゾウ…………… 0.5g

日局ケイヒ…………… 1.0g 日局ショウキョウ…… 0.25g

日局タイソウ…………… 1.0g

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物を含有します。

●保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用してください。
4. 本剤は生薬（薬用の草根木皮等）を用いた製品ですので、製品により多少顆粒の色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。
5. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

お問い合わせ先

本製品内容について、何かお気付きの点がございましたら、
お買求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元 ※



お客様相談窓口

☎ 0120-329-930

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

<http://www.tsumura.co.jp/>