

ツムラの漢方製剤
ツムラ漢方桃核承気湯エキス顆粒

「桃核承気湯」は、漢方の原典である『傷寒論』に記載されている漢方薬で、比較的体力がありのぼせて便秘しがちな方の「月経不順」、「月経困難症」、「腰痛」、「便秘」、「高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）」等に用いられています。
『ツムラ漢方桃核承気湯エキス顆粒』は、「桃核承気湯」から抽出したエキスより製した服用しやすい顆粒です。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

- 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）。
- 2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください

■ 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
(5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- (2) 1ヵ月位（便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合。
- 3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強がみられた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください
下痢。
- 4. 本剤の服用により、予期しない出血があらわれた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

●効能・効果

比較的体力があり、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：

月経不順、月経困難症、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の
随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）

●用法・用量

次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15 歳以上)	1 包(1.875 g)	2 回
7 歳以上 15 歳未満	2 / 3 包	
7 歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

●成分・分量

本品 2 包（3.75 g）中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス 1.5 g を含有
します。

日局トウニン…………… 2.5 g 日局カンゾウ…………… 0.75 g

日局ケイヒ…………… 2.0 g 乾燥ボウショウ…………… 0.45 g

日局ダイオウ…………… 1.5 g

添加物として日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局
乳糖を含有します。

●保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、
2 日以内に服用してください。
4. 本剤は生薬（薬用の草根木皮等）を用いた製品ですので、製品により
多少顆粒の色調等が異なることがあります効能・効果にはかわり
ありません。
5. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

お問い合わせ先

本製品内容について、何かお気付きの点がございましたら、
お買求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元



お客様相談窓口
電 話 (03) 3221-9700
受付時間 9:00~17:45(土、日、祝日を除く)
<http://www.tsumura.co.jp/>