

※※2009年9月改訂

※2007年5月改訂

漢方製剤

第2類医薬品

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ツムラの漢方製剤

ツムラ漢方八味地黄丸料エキス顆粒

「八味地黄丸」は、漢方の原典である『金匱要略』に記載されている漢方薬で、なかなか疲れがとれなくて、「腰が痛い」、「小便の出が悪い」、「夜何度も小便に起きる」、「軽い尿もれ」等の症状がある時に用いられています。

『ツムラ漢方八味地黄丸料エキス顆粒』は、「八味地黄丸」から抽出したエキスより製した服用しやすい顆粒です。

△使用上の注意

☒してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
そ の 他	のぼせ、どうき

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強がみられた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください 下痢。

※※●効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿
でときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、
頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

※※●用法・用量

次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15 歳以上)	1 包(2.5 g)	2 回
7 歳以上 15 歳未満	2 / 3 包	
4 歳以上 7 歳未満	1 / 2 包	
2 歳以上 4 歳未満	1 / 3 包	
2 歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

●成分・分量

本品 2 包(5.0 g)中、下記の割合の八味地黄丸エキス(処方解説、1/2 量) 2.8 g を含有します。

日局ジオウ…………… 2.5 g 日局ブクリョウ…………… 1.5 g

日局サンシュユ…………… 1.5 g 日局ボタンピ…………… 1.5 g

日局サンヤク…………… 1.5 g 日局ケイヒ…………… 0.5 g

日局タクシャ…………… 1.5 g 日局ブシ…………… 0.25 g

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、アメ粉、ショ糖脂肪酸エステルを含有します。

●保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用してください。
4. 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品ですので、製品により多少顆粒の色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。
5. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

お問い合わせ先

本製品内容について、何かお気付きの点がございましたら、
お買求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元 ※



お客様相談窓口

電 話 0120-329-930

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

<http://www.tsumura.co.jp/>