

チスゲンデラックス

CYSGEN DeLuxe



使用上の注意】



相談すること

1) 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

1. 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合

2) 次のような症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

下痢

【効能・効果】

☆滋養強壮

☆虚弱体質

☆肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

	1 回服用量	1 日服用回数
成人（15 歳以上）	1 錠 (水又は白湯にて食後服用)	1 ～ 2 回
15 歳未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

定められた用法・用量を守ること。(他のビタミン等を含む製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

【成分・分量】

チスゲンデラックスはエンジ色の糖衣錠で1日量（2錠）中に下記の成分を含有する。

アスコルビン酸（VC）	100.0mg
チアミン塩化物塩酸塩（VB ₁ ）	20.0mg
リボフラビン（VB ₂ ）	4.0mg
ピリドキシン塩酸塩（VB ₆ ）	2.0mg
シアノコバラミン（VB ₁₂ ）	4.0 μg
葉酸	0.2mg
パントテン酸カルシウム	6.0mg
ニコチン酸アミド	10.0mg
チオクト酸	10.0mg

L-メチオニン	20.0mg
L-シスチン	20.0mg
L-アスパラギン酸カリウム・マグネシウム	200.0mg
L-リジン塩酸塩	30.0mg
カルニチン塩化物	50.0mg
L-トレオニン	4.0mg
コンドロイチン硫酸ナトリウム	50.0mg
イノシトール	10.0mg
リコレックスP	20.0mg
グリセロリン酸カルシウム	20.0mg
ニンジンエキス	20.0mg
強力オキシレジネ末	20.0mg

添加物：赤色3号、赤色102号、黄色5号、青色2号、カルメロースナトリウム、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム、白糖、沈降炭酸カルシウム、アラビアゴム末、マクロゴール6000、タルク、精製セラック、カルナウバロウ

＜成分・分量に関連する注意＞

1. リボフラビンにより尿が黄色になることがありますが、心配ありません。
2. 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあるので、医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお知らせください。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
5. 湿気により表面が変色することがありますが、品質に問題ありません。

【包 装】

120 錠

【お問い合わせ先】

鶴原製薬株式会社 医薬情報部
(9～17時、月～金、祝日を除く)
TEL 072-761-1456 (代表)



製造販売元
鶴原製薬株式会社
大阪府池田市豊島北1丁目16番1号