

服用に際して、この説明文書を必ず読むこと
必要時に読めるように大切に保管すること

腹痛を伴う下痢、食あたりに

新タントーゼA[®]

止瀉薬

〔新タントーゼAの特徴〕

1. 下痢に有効です
塩化ベルベリンは、腸内の病原菌に殺菌的に作用しますので、細菌性の下痢や腸内の異常な発酵による下痢に効果があります
2. 腹痛をやわらげます
ロートエキスは、下痢の場合にしばしばみられる消化管のけいれんによる腹痛に対して、鎮痛効果をあらわします
3. すぐれた収れん作用があります
タンニン酸アルブミンの働きによって、腸粘膜に収れん作用をあらわし、下痢を止めます
4. 消化をたすけます
ウルソデオキシコール酸は、胆汁の分泌を促進して脂肪の消化をたすけます



〔使用上の注意〕



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください
本剤または牛乳によるアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人または粘液便の続く人
 - (3) 急性の激しい下痢または腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人(本剤で無理に下痢を止めるとかえって病気を悪化させることがある)
 - (4) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (5) 高齢者
 - (6) 本人または家族がアレルギー体質の人
 - (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人：排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人：心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください

口のかわき

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります

〔効能〕

下痢、腹痛を伴う下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

〔用法・用量〕

次の量を、水またはお湯で服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	4錠	3回まで (服用間隔を4時間以上あけること)
8歳～15歳未満	2錠	
5歳～ 8歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないこと	

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください
- (2) 錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる)



〔成分・分量〕

本剤は、微紅白色のフィルムコート錠で、12錠中に次の成分を含有する

塩化ベルベリン 300mg
 ロートエキス 60mg
 タンニン酸アルブミン 2000mg
 ウルソデオキシコール酸 30mg

添加物：ステアリン酸Mg, CMC-Ca, ヒドロキシプロピルセルロース, セルロース, 乳糖, ヒドロキシプロピルメチルセルロース, 酸化チタン, マクロゴール, 三酸化鉄

〔保管および取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わる）
- (4) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

〔お問い合わせ先〕

- (1) 購入した薬局、薬店
- (2) ゼファーマ株式会社 お客様相談室
 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-7-1
 電話番号 03-3661-2010
 受付時間 月～金曜日 9:00～17:00(祝日、年末年始を除く)

ゼファーマ ホームページ <http://www.zepharma.com>

発売元

ゼファーマ株式会社

東京都中央区日本橋本町2-7-1

製造販売元

テイカ製薬株式会社

富山市荒川1-3-27