

販売名：リキポリンD

第2類医薬品

〔成分・分量〕(100mL中)

チアミン硝化物…10mg、ピリドキシン塩酸塩…10mg、ニコチン酸アミド…25mg、タウリン…1000mg、無水カフェイン…50mg、ゴオウチンキ…0.2mL(原生薬換算量2.0mg)

(アルコール含有0.22mL以下)

添加物：クエン酸、白糖、安息香酸Na、パラベン、黄色4号(タートラジン)、香料

◎本品は生薬成分も含まれるので、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。

〔効能・効果〕

○滋養強壮 ○虚弱体質
○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

大人(15才以上) 1日1回1びん(100mL)
服用◎15才未満は服用しないでください。
◎用法・用量を厳守してください。

ガラス：びん 金属：キャップ

D 9E **¥250.＋税**

100mL

リキポリン[®]D

滋養強壮・虚弱体質

第2類医薬品



第一薬品株式会社

富山県富山市荒川一丁目4番26号
お客様相談室 076-432-2736(代表)

〔使用上の注意〕

【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2) 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の場合は、服用を中止し、この製品をもって医師又は薬剤師に相談すること

(1) 悪心、嘔吐、胃部不快感、軟便、下痢、便秘、発疹・発赤、ぜんそくなどの症状があらわれた場合。
(2) しばらく服用しても症状がよくなる場合。

〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用
期限

製造
番号