



腰痛・関節痛・肩こりに伴う肩の痛みに テイカパップ[®]〈IM〉

インドメタシン配合



貼っても臭いが**気にならない**
関節にも貼り良い**伸縮性**
インドメタシンが**痛み**に深く浸透



6 枚入

第2類医薬品

チャック

ここからハサミでお切りください。

開封後はチャックをきちんとして保管してください。





開封後はチャックをきちんとして保管してください。

使用する前にこの説明書を必ずお読みください。

品目番号82-414

インドメタシン配合 ティカパップ®(IM)

経皮浸透型鎮痛・消炎パップ剤

第2類医薬品

【ティカパップ (IM)の特長】

1. 経皮浸透したインドメタシンが痛みの原因物質(プロスタグランジン等)の生成を抑え、筋肉痛、関節痛、肘の痛み等にすぐれた効果を発揮します。
2. 肌にぴったり貼れる薄型シートで、のびのびタイプです。
3. 微香性でにおいがありません。

	肩こりに伴う 肩の痛み		打撲 捻挫		筋肉痛 関節痛
--	----------------	--	----------	--	------------

△ 使用上の注意

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
- 2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等 (2) しっしん、かぶれ、傷口
 - (3) みずむし・たむし等または化膿している患部
- 3. 長期連用しないでください。

○ 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 本人または家族がアレルギー体質の人
 - (4) 家によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書(アルミ袋)を持って医師または薬剤師にご相談ください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

〈効 能〉

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

〈用法・用量〉

プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 11歳未満の小児に使用させないでください。
- (4) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状のある場合だけ使用してください。
- (5) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (7) 連続して2週間以上使用しないでください。

〈成分・分量〉 膏体100g (1,000cm²)中

インドメタシン………375mg
 添加物:ヒマシ油、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中和物、尿素、CMC-Na、グリセリン、D-ソルビトール、エデト酸Na、酒石酸、0-メントール、アジピン酸ジイソプロピル、マクロゴール、カオリン、酸化チタン、セラチン、ポリソルベート80、水酸化Al、メタケイ酸アルミン酸Mg

〈保管および取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因となったり、品質が変わる。)
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、チャックをきちんとして閉めて保管してください。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造番号

お客様相談係

電話番号: 076(431)8863

受付時間: 9時から17時まで

(土、日、祝日を除く)

包 装 6枚入 [7.5cm×14.0cm]

使用期限

¥700+税



製造販売元

❧ ティカ製薬株式会社

〒930-0982 富山市荒川一丁目3番27号 C

副作用被害救済制度

☎0120-149-931