

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

目の異物感・なみだ目・充血・かゆみに

アイリスガードP (眼科用薬)

第2類医薬品

- ◆アイリスガードPは抗炎症成分のプラノプロフェンを配合した目薬です。
- ◆プラノプロフェンは炎症の原因物質(プロスタグランジン)の生成をおさえることにより、目の異物感(コロコロ・チクチクする感じ)・なみだ目・充血・かゆみ等の症状を緩和します。
- ◆やさしい清涼感の目薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

- (1) 7才未満の小児。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。



相談すること

- 1 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人。
緑内障

- 2 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、刺激感、異物感、なみだ目、目やに
その他	息苦しさ

- (2) 症状が悪化した場合。
- (3) 目のかすみ改善されない場合。(緑内障等の可能性も考えられる)
- (4) 3日位使用しても症状がよくなる場合。
- (5) 症状の改善がみられても、2週間を超えて使用する場合。



効 能

目の次の症状の緩和：異物感(コロコロ・チクチクする感じ)、なみだ目、結膜充血、目のかゆみ、目やにの多いときの目のかすみ

用法・用量

1回1～2滴、1日4回点眼してください。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。(一旦レンズをはずしてから点眼してください)
- (5)点眼用にのみ使用してください。

成 分

成 分

分 量

はたらき

プラノプロフェン

0.05%

目の炎症をおさえます。

添加物：ホウ酸、pH調節剤、エデト酸Na、BHT、塩化ベンザルコニウム、l-メントール、dl-カンフル、ポリソルベート80

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。特に自動車内や暖房器具の近くなど、高温となるおそれのある場所に放置しないでください。なお、本剤は光による品質の変化を防ぐため、密栓して、必ず添付の携帯用袋(しゃ光性がある)に入れてください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はすみやかに使用してください。(品質保持のため)
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合は、清潔なガーゼなどで軽くふきとって使用してください。



目薬をさす時の注意と正しいさし方

注 意

- 容器の先がまぶたやまつ毛にふれると、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。

正しいさし方

- 手をよく洗い、目に直接指がふれないようにしてください。
- やや上を向いて指で下まぶたをさげ、まぶたの裏側にしずくを落としてください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いいたします。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電 話 03-3985-1800
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

発 売 元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

http://www.taisho.co.jp

製造販売元

テイカ製薬株式会社

東京都荒川区荒川1丁目3番27号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)