

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

アスパラ目薬クールICプラス

目の疲れ・充血・かゆみに

Aspara

Super, refreshing Aspara COOL IC PLUS. Its multi-purpose formula includes seven ingredients which reduce eye fatigue and inflammation.

7種の有効成分と 冷たい刺激でリフレッシュ

アスパラ目薬クールICプラスは、強い清涼感が気持ちよく持続する目薬です。7つの有効成分が疲れ目や充血、かゆみなどの炎症を取り去ります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人。緑内障
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 目のかすみ改善されない場合。
 - 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

効 能

目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
また、混濁したものは使用しないでください。
- ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 点眼用にのみ使用してください。



成分(100mL中)

成 分	含 量	はたらき
L-アスパラギン酸カリウム	250mg	細胞に栄養を与え、新陳代謝を 活発にして疲れ目を改善します。
L-アスパラギン酸マグネシウム	250mg	
タウリン	500mg	
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	目のピント調節機能を改善し、 疲れ目を改善します。
塩酸テトラヒドロゾリン	50mg	目の血管を収縮して充血を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用で目のかゆみなどの 炎症を抑えます。
グリチルリチン酸二カリウム	250mg	充血や目のかゆみなどの炎症を鎮めます。


添加物：ホウ酸、ホウ酸Na、エデト酸Na、*l*-メントール、*dl*-カンフル、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、ポリソルベート80

〈成分に関連する注意〉

本剤は点眼後、ときに口の中に甘味を感じることがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通して口の中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取扱い上の注意


- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(品質を保持するため車中・暖房器具の近くなど
高温となる場所に保管しないでください。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲や
キャップの内側に白く付くことがあります。このような場合には
清潔なガーゼなどで軽くふき取って使用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



お願い

ツイストキャップの開封方法：必ずキャップを上にして
あけてください。

- あけ方 キャップを手前にひねります。(容器の中心
を押さえたまま開封すると薬液がとびだすことが
ありますので、ご注意ください。)
- しめ方 カチッと音がするまで押し下げます。



販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区道修町3-2-10

製造販売元
テイカ製薬株式会社
富山市荒川一丁目3番27号

本品のお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願いいたします。

田辺三菱製薬「くすり相談センター」
(フリーダイヤル ☎0120-54-7080)
受付時間：弊社営業日の9:00～17:30

ホームページ www.mt-pharma.co.jp

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
(独)医薬品医療機器総合機構 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)