

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読み下さい。

うちみ・ねんざ・筋肉痛に

新ノイガンハップクール

冷たい貼りごこち

特長

新ノイガンハップクールは、生薬を配合した冷たい貼りごこちの消炎・鎮痛パップ剤です。消炎・鎮痛成分と3種の生薬（オウバク、サンシシ、サンショウ）エキスが、はれ、熱感などの急性炎症を伴う、うちみ、ねんざ、筋肉痛などに効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の部位には使用しないで下さい。

- (1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1)本人又は家族がアレルギー体質の人
(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱（又は袋）を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】打撲、捻挫、筋肉痛、筋肉疲労、骨折痛、関節痛、腰痛、肩こり、しもやけ

【用法・用量】表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付して下さい。

<用法・用量に関する注意>

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。

第3類医薬品

(2)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用して下さい。

(3)皮ふの弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないで下さい。
（使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。）

【成分・分量】（膏体100g（1,000cm²）中）

サリチル酸グリコール……2.0g ℓ-メントール………1.0g
d-カンフル ……0.5g 酢酸トコフェロール………0.3g
グリチルリチン酸 ……0.03g
オウバク軟エキス………0.7g（原生薬として2.31g）
サンシシ軟エキス ……0.33g（原生薬として1.0g）
サンショウ軟エキス………0.3g（原生薬として1.0g）

添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸Na、ポリソルベート80、尿素、エドト酸Na、カオリン、pH調整剤、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3)他の容器に入れ替えないで下さい。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんとしめて外気にふれないようにして下さい。
(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【包装】15枚入（1枚：14cm×10cm、14g）

《販売名》新ノイガンハップクール

お問い合わせ先

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室

(03) 3293-3363（ダイヤルイン）

（月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 但し祝日を除く）



販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

http://www.wakunaga.co.jp/

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ここを押して
開けて下さい

