

使用に際してこの説明書をよく読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

【特 長】

- ・ケアルラパッチは、かゆいところにペタンと貼るだけで、かゆみをおさえるパッチです。かき傷も防げます。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜 (例えば、口唇等)
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、色素沈着

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合

【効能・効果】 虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】 パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守すること。

- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 汗をかいたり、皮ふがぬれているときは、よくふき取ってから使用すること。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 皮ふの弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。

【成分・分量】1m² (膏体100g) 中

クロタミトン・・・・・・・・・・5.0g

リドカイン・・・・・・・・・・2.0g

ジフェンヒドラミン・・・・・・・・1.0g

イソプロピルメチルフェノール・・・・1.0g

添加物として、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ハイスポリイソブレンゴム、BHTを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分は袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

【包 装】 36枚入 (18枚×2袋) (直径30mmの円形)

＜お問い合わせ先＞

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電話 (0879) 25-2363

受付時間

9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

販売名 ケアルラパッチ

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地 4

第2類医薬品

