

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

鎮痛・消炎パップ剤

スキュータムA 冷感

12枚入 [6枚入×2袋] 1枚サイズ 14cm×10cm

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】 腰痛、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛、打撲、捻挫

【用法・用量】 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (4) 皮ふの弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。
(使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。)

【成分・分量】 膏体100g (875cm²) 中

サリチル酸グリコール…………… 1.0g グリチルリチン酸…………… 0.03g
ℓ-メントール…………… 0.5g アルニカチンキ…………… 1.0ml
(原生薬換算量 0.2g)

添加物として、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸部分中和物、ポリソルベート80、エデト酸Na、カオリン、酸化チタン、pH調整剤、その他4成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

〈お問い合わせ先〉

帝國製薬株式会社 お客様相談室
電 話 (0879) 25-2363
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

販売名：スキュータムA


製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

環境にやさしいパッケージを使っています。



ここを押して
開けて下さい。