

虫さされ、かゆみに

第2類医薬品

ホルキスパッチ

【特長】ホルキスパッチは、かゆいところにベタンと貼るだけで、かゆみをおさえるパッチです。かき傷も防げます。

使用に際してこの説明書をよく読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

⚠使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口

🗉 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、色素沈着

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合

【効能・効果】虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 汗をかいたり、皮ふがぬれているときは、よくふき取ってから使用すること。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 皮ふの弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。

【成分・分量】1m²(膏体100g)中

クロタミトン 5.0g リドカイン 2.0g
ジフェンヒドラミン 1.0g イソプロピルメチルフェノール 1.0g
添加物として、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ハイスポリイソプレンゴム、BHTを含む。

＜保管及び取扱い上の注意＞

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分は袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管すること。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

【包装】80枚入(20枚×4袋)(直径3cmの円形)

＜お問い合わせ先＞

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電 話 (0879) 25-2363

受付時間 9:00～17:00

(土・日・祝日を除く)

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567



ここを押して
開けて下さい

副作用被害救済制度

☎0120-149-931



4 987373 069840