

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痛・消炎バップ剤【弱酸性バップ】

ウインパスホット

第3類医薬品

【特徴】

- ウインパスホットは、鎮痛・消炎効果と温感作用をあわせもった鎮痛・消炎温感バップ剤です。
- ウインパスホットは、4種の有効成分(サリチル酸グリコール、*l*-メントール、*dl*-カンフル、トウガラシエキス)の働きで、肩こり、腰痛、関節痛などによく効きます。
- ウインパスホットは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 次の部位には使用しないこと
- (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法・用量】 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1〜2回貼付する。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 打撲(うちみ)、捻挫には、はれがひいてから使用すること。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (5) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないこと。
- (6) 本剤を貼ったまま、あるいは剥がした直後に入浴しないこと。
(強い刺激を感じるがあるので、少なくとも入浴の1時間前には剥がし、入浴後は30分程してから使用すること。)
- (7) 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないこと。
- (8) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。

【成分・分量】 膏体100g(1000cm²)中

サリチル酸グリコール・・・0.5g トウガラシエキス・・・0.3g
l-メントール・・・0.2g (原生薬換算量 3.75g)
dl-カンフル・・・0.2g

添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸Na、プロピレングリコール、尿素、エデト酸Na、カオリン、pH調節剤、その他3成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用すること。

＜包 装＞ 30枚入[6枚×5袋] (1枚:14cm×10cm)

〈お問い合わせ先〉
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電話 (0879)25-2363
受付時間 9:00〜17:00
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



セルフメディケーション

税 控除 対象

製造販売元

帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地



4 987373 065477