

オムニード かぜペックタン

胸サイズ のどにも
貼れます

12枚入

〔販売名〕

オムニード かぜペックタン

使用に際しては、この説明書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限（パッケージ天面および個包装裏面に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元

帝國製薬グループ

テイコクファルマケア株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

www.teikoku-pc.co.jp

PHARMACARE[®]
ファルマケア

指定医薬部外品

サイズ 6cm×8cm

⚠ 使用上の注意

本剤は、かぜに伴う鼻づまりやくしゃみ等の諸症状を緩和するものであり、熱を下げることを目的として使用するものではないことに留意すること。

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の部位には使用しないこと。

- (1) 目の周囲、粘膜など
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

① 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 熱がある人または症状が長びいている人
- (5) 妊婦または妊娠していると思われる人

② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師または薬剤師に相談すること。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなりません

〔効能・効果〕

鼻づまり、くしゃみ等のかぜに伴う諸症状の緩和

〔用法・用量〕

1日3回、ライナー（透明フィルム）をはがし、胸またはのどに貼ってください。

1回量：15才以上 2枚、8才以上15才未満 1枚、5才以上8才未満 2/3枚、3才以上5才未満 1/2枚

（用法・用量に関連する注意）

- (1) 定められた用法・用量を守ること。
- (2) 3才未満の小児には使用させないこと。
- (3) 3才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させること。特に小児が誤って口に入れないよう十分注意すること。万一、誤って口に入れた場合は、直ちに吐き出させること。
- (4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用すること。

〔成分・分量〕膏体100g中（1429cm²中）

dl-カンフル・・・・・・・・・・0.5 g
 テレピン油・・・・・・・・・・0.4 g
 ユーカリ油・・・・・・・・・・0.2 g
 l-メントール・・・・・・・・・・0.2 g
 オウバク軟エキス（原生薬換算量：3.3g）・・・1.0 g
 添加物としてCMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸Na、エデト酸Na、カオリン、pH調整剤、その他3成分を含有する

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光のあたらない涼しいところに保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり、品質が変わる）。
- (4) 品質保持のため、未使用分はもとの袋に入れ、開封口を2回折り曲げ、外気に触れないようにすること。
- (5) 衣服や寝具などに薬剤が付着すると、黄色に着色することがある。特にシルク製品の場合は、着色すると落ちないので注意すること。

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地



ここを押して
開けて下さい。

〈お問い合わせ先〉

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電 話 (0879) 25-2363

受付時間 9:00～17:00

（土・日・祝日を除く）