

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

鎮痛・消炎パッチ剤 Pain Relief Gel Patch Hot

スキュータムID 0.5%ホット 温感 販売名:スキュータムID0.5%ホット



腰痛

肩こり

関節痛

特徴

- スキュータムID0.5%ホットは、痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮めるインドメタシンと患部の血行をよくするトウガラシエキスを配合した温感タイプのパッチ剤です。
- スキュータムID0.5%ホットは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
(1)本剤又は本剤の成分により過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないこと
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。
(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないこと

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。
●15歳未満の小児は使用しないこと。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)打撲(うちみ)、捻挫に使用する場合には、患部の熱感等の症状がおさまってから使用すること。
- (3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であるので、症状がある場合だけ使用すること。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (5)本剤を使用してから汗をかくと刺激を感じることがある。
- (6)本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないこと。
- (7)本剤を貼ったまま、あるいは剥がした直後に入浴しないこと。(強い刺激を感じることがあるので、少なくとも入浴の1時間前には剥がし、入浴後は30分程してから使用すること。)
- (8)本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないこと。
- (9)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。

成分・分量 膏体100g(1000cm²)中

インドメタシン	0.5g
トウガラシエキス	0.1g(原生薬換算量 1.25g)

添加物として、マクロゴール、パラベン、エデト酸Na、D-ソルビトール、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、メチルセルロース、CMC-Na、グリセリン、香料、pH調整剤、その他3成分を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

28枚入(7枚×4袋)



10cm

原寸大



製造販売元
帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

〈お問い合わせ先〉
本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記にお願い致します
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電話(0879)25-2363
受付時間9:00～17:00(土・日・祝日を除く)



MADE IN JAPAN