

ご使用に際して、この説明文書を必ず
お読みください。また、必要なときに読
めるよう大切に保管してください。

ここを押して
開けて下さい。

第2類医薬品



販売名：ティマックスIDプラスター

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を
起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 11歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないこと

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売 者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可 能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持っ て医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、 ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は 使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は 登録販売者に相談すること

【効能・効果】

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・
手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

ライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 11歳未満の小児は使用しないこと。
- (2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護
者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 用法・用量を厳守すること。

(4) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療
するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する
薬剤であるので、症状がある場合だけ使用すること。

(5) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取っ
てから使用すること。

(6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇
所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、
発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないこと
を確かめてから使用すること。

【成分・分量】 膏体100g(1m²)中

インドメタシン.....3.75g
L-メントール.....3.0g
添加物として、ステレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、
ポリブテン、BHT、流動パラフィン、その他1成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管
すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり
品質が変わる。)
- (4) 未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと二重に
折り曲げて保管すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用
期限内であっても開封後はなるべく早く使用すること。

お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電 話 (0879) 25-2363

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

発 売 元 ティコクファルマケア株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元 帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地



4 987373 082962



〈実物大〉

10 cm

↑ 7 cm ↓