

ご使用にあたって、次の説明を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう保管してください。

第3類医薬品

生薬エキス中京パップ剤

爽快な香りの冷感タイプ
販売名：フリーティア

<フリーティアの特徴>

フリーティアには、3種類の生薬のエキス(オウバク、サンシシ)・チンキ(アルニカ)とサリチル酸グリコール、*l*-メントール、*dl*-カンフル、トコフェロール酢酸エステルの計7種類の有効成分を配合していますので、すぐれた鎮痛消炎効果を発揮します。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

打撲、ねんざ、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、関節痛、肩こり、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】

表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (4)皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないでください。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。)

【成分・分量】膏体100g(875cm²)中

サリチル酸グリコール	1.0g	<i>l</i> -メントール	1.0g
<i>dl</i> -カンフル	0.5g	トコフェロール酢酸エステル	0.3g
オウバク軟エキス	0.3g(原生薬換算量 1.0g)		
サンシシ軟エキス	0.167g(原生薬換算量 0.5g)		
アルニカチンキ	0.5ml(原生薬換算量 0.1g)		

添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸 Na、尿素、エドト酸 Na、カオリン、酸化チタン、pH 調整剤、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて保管してください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)配置期限の過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】7枚入(1枚サイズ：8×12cm)

本品は生薬(オウバク・サンシシ)エキスを配合していますので、製品により色調が多少異なることがあります。品質には変わりありません。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

0205

¥680+税

製造番号



世界の子供たちに健康と教育を

国際貢献活動を支援します

この商品の売り上げの一部は「きずなASSIST基金」に寄付されます。

配置期限
(西暦年月)

株式会社 中京医薬品

愛知県半田市島崎北浦町2-15-1

<製造販売元>

帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

(お問い合わせ先)
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電 話 (0879) 25-2363
受付時間 9:00～17:00
(土・日・祝日を除く)

