

# 虫さされ、かゆみに モスキンパッチ

第2類医薬品

使用に際してこの説明書をよく読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

## △ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。

### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感、色素沈着

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[効能・効果] 虫さされ、かゆみ、しもやけ

[用法・用量] パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

(4)汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用してください。

(5)皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないでください。

【成分・分量】膏体100g(1m<sup>2</sup>)中

クロタミトン ······ ······ ······ 5.0g  
リドカイン ······ ······ ······ 2.0g  
ジフェンヒドラミン ······ ······ ······ 1.0g  
イソプロピルメチルフェノール ······ ······ 1.0g

添加物として、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ハイシスピリイソブレンゴム、BHTを含みます。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管してください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包 装】 48枚入(24枚×2袋)(直径30mmの円形)

ここを押して  
開けて下さい



## 第2類医薬品

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

販売名 モスキンパッチ

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

4 980673 002388

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電話(0879)25-2363 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)