

インドメタシン3.75%配合

ティプラスターID

第2類医薬品

- ティプラスターIDは、有効成分インドメタシンが痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮める消炎鎮痛インドメタシン配合テープ剤です。
- ティプラスターIDは、粘性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、関節部位にもピッタリフィットします。

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は使用しないこと
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
(3) 11歳未満の小児。
 2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし、たむし等又は化膿している患部。
 3. 連続して2週間以上使用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

ライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 11歳未満の小児は使用しないこと。
- (2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 用法・用量を厳守すること。
- (4) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であるので、症状がある場合だけ使用すること。
- (5) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。

【成分・分量】

膏体100g(1m²)中
インドメタシン・・・・・・ 3.75g
添加物として、ステレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリブテン、BHT、 α -メントール、香料、流動パラフィン、その他1成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用すること。

(包装) 10枚入り(1枚:7cm×10cm)

発売元
ティコファルマケア株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元
帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

(お問い合わせ先)
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電 話 (0879)25-2363
受付時間 9:00～17:00
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎020-149-931



POS 1.0倍見本

4 987373 066863

