

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

消炎鎮痛フェルビナクプラスター-S 第2類医薬品

【特徴】

- 消炎鎮痛フェルビナクプラスター-Sは抗炎症・鎮痛成分フェルビナクを5.0%配合したプラスター剤です。
- 消炎鎮痛フェルビナクプラスター-SはビタミンE誘導体(トコフェロール酢酸エステル)が末梢の血流を促進し、更に、*L*-メントールの働きで心地よい冷感刺激があり、痛みをやわらげます。
- 消炎鎮痛フェルビナクプラスター-Sは目立ちにくい肌色で伸縮性のあるニットを使用しています。



使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 15歳未満の小児は使用しないこと。
- (2) 用法・用量を厳守すること。
- (3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であるので、症状がある場合だけ使用すること。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。

【成分・分量】 膏体100g(1㎡)中

フェルビナク……………5.0g
L-メントール……………3.0g
トコフェロール酢酸エステル……………2.3g
添加物として、スチレン・イソブレン・スチレンブロック重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、流動パラフィン、BHT、その他2成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用すること。

【包装】 12枚入(6枚×2袋) [1枚の大きさ:14cm×10cm]

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願致します。
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電 話 (0879) 25-2363
受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

