

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

ユノパツプホットS

第3類医薬品

特徴

- 患部の血行を良くするトコフェロール酢酸エステルと温感刺激を付与する植物性生薬(トウガラシ)エキスの働きで、肩こり、腰痛、関節痛などによく効きます。
- 鎮痛効果を発揮するサリチル酸グリコールと抗炎症作用をもつ植物性生薬(オウバク、サンシシ)エキスを配合したパップ剤です。
- 粘着性に優れた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法・用量 表面のライナー(プラスチックフィルム)をはがし、患部に1日1～2回貼付する。

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 打撲(うちみ)、捻挫には、はれがひいてから使用すること。
- 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。

- 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないこと。
- 本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないこと。(強い刺激を感じることがあるので、少なくとも入浴の1時間前にははがし、入浴後は30分位してから使用すること。)
- 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないこと。
- 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。)

成分・分量

膏体100g(1000cm²)中

サリチル酸グリコール	2.0g	オウバク軟エキス	0.7g
dl-カンフル	0.5g	(原生薬換算量2.31g)	
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	サンシシ軟エキス	0.33g
トウガラシエキス	0.3g	(原生薬換算量1.0g)	
	(原生薬換算量3.75g)		

添加物として、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、エデト酸Na、カオリン、ポリソルベート80、pH調整剤、その他3成分を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

包装

28枚入[7枚入×4袋](1枚:10×14cm)

<お問い合わせ先>

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室
電 話 (0879) 25-2363
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地



4 980673 002647

開封後は
1ヶ月以内に
使い切る