

使用に際してこの説明書をよく読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

【特徴】

- かゆみ止めパッチCは、かゆいところにペタンと貼るだけで、かゆみをおさえるパッチです。かき傷も防げます。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付する。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 外用にのみ使用すること。

(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用すること。

(5) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ場所に長時間続けて使用しないこと。

【成分・分量】膏体100g(1m²)中

ジフェンヒドラミン・・・・・・・・・・1.0g

リドカイン・・・・・・・・・・2.0g

イソプロピルメチルフェノール・・・・・・・・1.0g

サリチル酸グリコール・・・・・・・・1.0g

添加物として、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ポリブテン、BHT、流動パラフィン、その他2成分を含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であつても開封後はなるべく早く使用すること。

【包装】40枚入(20枚×2袋)(直径30mmの円形)

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記に
お願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電話(0879)25-2363

受付時間

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

第2類医薬品

販売名 かゆみ止めパッチC

セルフメディケーション

税 控除 対象

