

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

コリスチック冷感パップG 第3類医薬品

こんな方におすすめ ●肩、腰、関節などの痛みにお悩みの方

特徴

- コリスチック冷感パップGは、鎮痛・消炎効果と冷シブ作用をあわせもった鎮痛・消炎パップ剤です。
- コリスチック冷感パップGは、4種の有効成分(サリチル酸グリコール、dℓ-カンフル、ℓ-メントール、トコフェロール酢酸エステル)の働きで、筋肉痛、打撲、ねんざ等によく効きます。
- コリスチック冷感パップGは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

成分・分量

膏体100g(1400cm²)中

サリチル酸グリコール 1.0g
dℓ-カンフル 0.5g
ℓ-メントール 0.3g
トコフェロール酢酸エステル 0.3g

添加物として、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、エデト酸Na、酸化チタン、pH調整剤、その他4成分を含有する。

用法・用量

表面のライナー(プラスチックフィルム)をはがし、患部に1日1～2回貼付する。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (4)皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。)

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電話(0879)25-2363
受付時間9:00～17:00(土・日・祝日を除く)



※この商品は(株)マツモトキヨシ
ホールディングスのオリジナル商品です。

MADE IN JAPAN

48枚入(8枚×6袋)