

Pain Relief and Anti-Inflammatory Cooling Patches
Cool type patch with active ingredient glycol salicylate. Effective for stiff shoulders, bruises, muscular pain, etc.

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

コリスチック冷感パップG 第3類医薬品

こんな方におすすめ ●肩、腰、関節などの痛みにお悩みの方

- 特徴**
- コリスチック冷感パップGは、鎮痛・消炎効果と冷シッパ作用をあわせもった鎮痛・消炎パップ剤です。
 - コリスチック冷感パップGは、4種の有効成分（サリチル酸グリコール、dℓ-カンフル、ℓ-メントール、トコフェロール酢酸エステル）の働きで、筋肉痛、打撲、捻挫等によく効きます。
 - コリスチック冷感パップGは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

使用上の注意

- ❌してはいけないこと**
- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
次の部位には使用しないこと
- （1）目の周囲、粘膜等。（2）湿疹、かぶれ、傷口。

- 相談すること**
- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

成分・分量	膏体100g(1400cm ²)中
サリチル酸グリコール	1.0g
dℓ-カンフル	0.5g
ℓ-メントール	0.3g
トコフェロール酢酸エステル	0.3g
添加物として、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、エデト酸Na、酸化チタン、pH調節剤、その他4成分を含有する。	

- 用法・用量**
- 表面のライナー（プラスチックフィルム）をはがし、患部に1日1～2回貼付する。
- 〈用法・用量に関する注意〉**
- （1）用法・用量を厳守すること。
 - （2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
 - （3）汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
 - （4）皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。（使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。）

- 保管及び取扱い上の注意**
- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
 - （2）小児の手の届かない所に保管すること。
 - （3）他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
 - （4）使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

製造販売元
帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

（お問い合わせ先）
本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電話（0879）25-2363
受付時間9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

※この商品は（株）マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。

4 987373 078439

セルフレジ専用
税 控除 対象

MADE IN JAPAN

48枚入（8枚×6袋）

