

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## コリスチックIDパップ0.5% 第2類医薬品

こんな方におすすめ ●肩、腰、関節などの痛みにお悩みの方

### 特徴

- コリスチックIDパップ0.5%は、有効成分のインドメタシンが痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮める鎮痛・消炎インドメタシンパップ剤です。
- コリスチックIDパップ0.5%は、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。
- コリスチックIDパップ0.5%は、基剤中の水分により、打撲、ねんざ等による熱を持った患部を心地よく冷却します。



### 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

##### 1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分により過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。

##### 2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

##### 3. 連続して2週間以上使用しないこと



#### 相談すること

##### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

##### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状                                |
|------|------------------------------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血 |

##### 3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 効能・効果

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

### 成分・分量

膏体100g(1400cm<sup>2</sup>)中

インドメタシン ..... 0.5g

添加物として、マクロゴール、*l*-メントール、酸化チタン、エデト酸Na、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、CMC-Na、グリセリン、香料、pH調整剤、その他3成分を含有する。

### 用法・用量

ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。

●15歳未満の小児は使用しないこと。

#### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であるので、症状がある場合だけ使用すること。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用すること。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、  
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
帝國製薬株式会社 お客様相談室  
電話(0879)25-2363  
受付時間9:00～17:00(土・日・祝日を除く)



4 987373 078460

セルフメディケーション

税 控除 対象

※この商品は(株)マツモトキヨシ  
ホールディングスのオリジナル商品です。

MADE IN JAPAN

32枚入(8枚×4袋)