

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

水虫、たむしに1日1回

DHC スアシナクリーム

<水虫・たむし治療薬>

第②類医薬品

DHCスアシナクリームは、4つの作用で患部に多角的にアプローチする水虫・たむし治療薬です。原因菌（白癬菌）を殺菌する成分に加え、かゆみや炎症を鎮める成分を配合。1日1回塗るだけで、水虫・たむしを改善します。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください。

（1）目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。

（2）湿疹。

（3）湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

（1）医師の治療を受けている人。

（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。

（3）乳幼児。

（4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

（5）患部が顔面又は広範囲の人。

（6）患部が化膿している人。

（7）「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。

（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、水疱、亀裂、乾燥感、ヒリヒリ感

3. 2週間位使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

■ 用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- 1.患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- 2.目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- 3.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 4.外用にのみ使用してください。

■ 成分・分量

100g中

成 分	分 量	作 用
ブテナフィン塩酸塩	1.0g	原因菌(白癬菌)を殺菌します。
クロタミトン	5.0g	かゆみを鎮めます。
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用でかゆみを鎮めます。
グリチルレチン酸	0.5g	炎症を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.5g	かゆみ・炎症を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.3g	殺菌作用で清潔に保ちます。
l-メントール	2.0g	清涼感でかゆみを鎮めます。
dl-カンフル	1.0g	清涼感でかゆみを鎮めます。

添加物として、プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、ポリソルベート80、カルボキシビニルポリマー、L-アラギニン、パラベンを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

医薬品
相談室

tel. 03-3762-2581
受付時間 9:00～17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製造販売元
株式会社ディーエイチシー
東京都港区南麻布2-7-1
0120-333-906 www.dhc.co.jp