

第2類医薬品

7-1141114
DHC

押してあげる

肌荒れ・乾燥肌治療薬

DHC ウルドイドクリーム

<乾燥性皮膚治療薬>

80g

第2類医薬品

この箱の説明書は、ご使用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

- 保湿・血行促進作用をもつ **ヘパリン類似物質を0.3%配合**。
- なめらかにのび広がり、肌表面にしっかり密着。**乾燥から患部を保護**します。
- ベタつかないクリームタイプで、**肌が敏感な方や赤ちゃんにも**お使いいただけます。

※顔面のきず・やけどのあと、目や粘膜には使用しないでください。

無香料・無着色・ステロイドフリー・エタノールフリー

保管及び取扱上の注意

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

医薬品
相談室

tel.044-233-2029
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日をのぞく)

株式会社ディーエイチー
製造販売元 東京都港区南麻布2-7-1
0120-333-906 www.dhc.co.jp

◆ 使用上の注意 ◆

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は使用しないでください。

(1)出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。

(2)わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。

(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)

2.次の部位には使用しないでください。

目、粘膜(口腔、鼻腔、膈など)

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人。

(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3)湿潤やただれのひどい人。

2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

DHC
ウルドイドクリーム

肌荒れ・乾燥肌
治療薬

ヘパリン類似物質
0.3%配合

手指のひび・あかざれ、
ひじ・かかとのゴワつきに

のびがよく、ベタつかない

なめらかになじみ、しっとり保湿

繊細な赤ちゃんの肌にも

80g

第2類医薬品

効能・効果

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかざれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量 1日1~数回、適量を患部に擦り込むか、またはガーゼ等のにばして貼ってください。

用法・用量に関連する注意

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には医師の診療を受けてください。

(3)外用にのみ使用してください。

◆ 成分・分量 ◆

100g中

成分	分量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3g	血行を促進し、皮膚を保湿します

添加物として、グリセリン、スクワラン、流動パラフィン、ワセリン、パラフィン、マイクロクリスタリンワックス混合物、サラシミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、硫酸Mg、パラベンを含有します。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/
0120-149-931



外箱



容器



4 511413 804292



管理コード 4121632J01

40580 02J01

各県支店

店舗検索